



## રસીકરણ



### સગાર્ભ સત્રીઓ, નવજાત શિશુઓ અને બાળકો માટે રાષ્ટ્રીય રસીકરણ સમય પત્રક

રસી	કચારે આપવી	ડોઝ	કચાં આપવી	કચા અંગમાં આપવી
-----	------------	-----	-----------	-----------------

#### સગાર્ભ સત્રીઓ માટે

ટીડી - ૧	સગાર્ભિવસ્થા દરમ્યાન વહેલી તકે	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	હાથનાં બાવડા પર
ટીડી - ૨	ટી.ડી. ૧ રસી આપ્યાના ચાર અઠવાડીયા પછી	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	હાથનાં બાવડા પર
ટીડી બુસ્ટર	છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સગાર્ભિવસ્થામાં ટીડી/ટીડી ની રસીના જે ડોઝ લીધા હોય તો	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	હાથનાં બાવડા પર

#### નવજાત શિશુઓ માટે (૦ થી ૧ વર્ષ દરમ્યાન)

ઝેરી કમળાની રસી	જન્મ સમયે અથવા જન્મના રણ કલાકમાં, શક્ય એટલા વહેલા	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	ડાબી જંધ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ
ઓરલ પોલીયો-૦	જન્મ સમયે અથવા જન્મના ૧૫ દિવસની અંદર, શક્ય એટલાં વહેલા	બે ટીપાં	મોં વાટે	મોં વાટે
બી.સી.જી.	જન્મ સમયે અથવા બાળક એક વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં શક્ય હોય તેટલું વહેલું	૦.૧ મિ.લિ. <small>(બાળક એક મહિનાનું થાય ત્યાં સુધી ૦.૦૫ મિ.લિ.)</small>	ચામડીના પ્રથમ પડમાં (Intradermal)	ડાબા હાથના બાવડા પર
ઓરલ પોલીયો ૧,૨,૩	છંકા અઠવાડિયે, ૧૦માં અઠવાડિયે, ૧૪માં અઠવાડિયે	બે ટીપાં	મોં વાટે	મોં વાટે
રોટા વાયરસ ૧,૨,૩	છંકા અઠવાડિયે, ૧૦માં અઠવાડિયે, ૧૪માં અઠવાડિયે	૨ મિ.લિ.	મોં વાટે	મોં વાટે
ન્યુમોકોકલ કોન્જયુગેટ વેક્સીન ૧,૨,બુસ્ટર	છંકા અઠવાડિયે, ૧૪માં અઠવાડિયે, ૮ મહિના પુરા થાય ત્યારે	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	જમણી જંધ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ
પેન્ટાવેલેન્ટ ૧,૨,૩	છંકા અઠવાડિયે, ૧૦માં અઠવાડિયે, ૧૪ અઠવાડિયે	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	ડાબી જંધ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ
એફ-આઈ.પી.વી. ૧,૨,૩	છંકા અઠવાડિયે, ૧૪માં અઠવાડિયે, ૮ મહિના પુરા થાય ત્યારે	૦.૧ મિ.લિ.	ચામડીના પ્રથમ પડમાં	પ્રથમ અને બીજે ડોઝ - જમણા હાથના બાવડા પર બીજે ડોઝ - ડાબા હાથના બાવડા પર
ઓરી-રૂબેલા - ૧	૮ મહિના પુરા થયા પછી અને ૧૨ મહિના સુધીમાં (૫ વર્ષ સુધી આપી શકાય)	૦.૫ મિ.લિ.	ચામડીની નીચે	જમણા હાથનાં બાવડા પર
વિટામીન-એ પહેલો ડોઝ	૮ મહિના ઓરી-રૂબેલાની રસીની સાથે	૧ મિ.લિ.	મોં વાટે	મોં વાટે

#### બાળકો માટે (૧ વર્ષ થી ૧૫ વર્ષ દરમ્યાન)

ઓરી-રૂબેલા - ૨	૧૫ થી ૨૪ મહિના	૦.૫ મિ.લિ.	ચામડીની નીચે	જમણા હાથનાં બાવડા પર
ત્રિગુણી બુસ્ટર - ૧	૧૫ થી ૨૪ મહિના	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	ડાબી જંધ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ
ઓરલ પોલીયો બુસ્ટર	૧૫ થી ૨૪ મહિના	બે ટીપાં	મોં વાટે	મોં વાટે
વિટામીન એ બીજો થી નવમો ડોઝ	૧૫ મહિને ત્રિગુણી/ઓરલ પોલીયો બુસ્ટર સાથે ત્યાર બાદ દર છ મહિને	બે મિ.લિ.	મોં વાટે	મોં વાટે
ત્રિગુણી બુસ્ટર - ૨	૫ થી ૫ વર્ષ	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	હાથનાં બાવડા પર
ટીડી	૧૦ વર્ષે અને ૧૫ વર્ષે	૦.૫ મિ.લિ.	સ્નાયુમાં	હાથનાં બાવડા પર

સગાર્ભિવસ્થા તરફ અઠવાડિયા થાય તે પહેલાં ટીડી/ટીડીની રસી-૨ અથવા બુસ્ટર ડોઝ આપી દેવો. આમ છતાં તરફ અઠવાડિયાથી વધુ સમય પસાર થઈ ગયો હોય તો પણ આ ડોઝ આપવો. સગાર્ભ સત્રીને અગાઉ ટીડી/ટીડીની રસી આપવામાં ન આવી હોય તો પ્રસૂતિની પીડા વખતે ટીડી/ટીડીની રસી આપવી.

**સગાર્ભ સત્રી તથા બાળક બંનો દરેક રસી સમયસર મળવી જરૂરી છે.**

